



# Queen<sup>®</sup>

Inatreq<sup>™</sup> Active

**FUNGICIDE**

GROUP

21 | 03

FUNGICIDE

## FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN GRANEN

Aard van het preparaat: EC - Emulgeerbaar concentraat  
Werkzame stof : fenpicoxamid (inatreq) + prothioconazool

Gehalte: 50 g/L + 100 g/L

Professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 16560N

### Toelatingshouder :

Corteva Agriscience Netherlands B.V.

Zuid-Oostsingel 24D

4611 BB Bergen op Zoom

Tel : 0164 444 000

Website : [www.corteva.nl](http://www.corteva.nl)

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

Lotnummer : zie op de fles



276317

2311

<sup>™</sup> © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

**STORL**

VERPAKKING

BEDRIJFS-  
AFVAL

**MANDATORY REQUIREMENT:**  
**IS AREA MUST BE BLANK (for 2D Data Matrix,  
Lot Nr., Manufacturing Date ...)**

5L e

# WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

## Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	Echte meeldauw <sup>1</sup> , Gele bladvlekkenziekte <sup>2</sup> , Kafjesbruin <sup>3</sup> , Fusarium <sup>4</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte <sup>7</sup>	1,5 L/ha	
Winterrogge	Bladvlekkenziekte <sup>8</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup> , Echte meeldauw <sup>1</sup> , Fusarium <sup>9</sup>	2,0 L/ha	1
Triticale	Echte meeldauw <sup>1</sup> , Gele bladvlekkenziekte <sup>2</sup> , Kafjesbruin <sup>3</sup> , Fusarium <sup>4</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte <sup>7</sup>	1,5 L/ha	
Spelt	Echte meeldauw <sup>1</sup> , Gele bladvlekkenziekte <sup>2</sup> , Kafjesbruin <sup>3</sup> , Fusarium <sup>4</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte <sup>7</sup>	1,5 L/ha	

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Zomertarwe	Echte meeldauw <sup>1</sup> , Gele bladvlekkenziekte <sup>2</sup> , Kafjesbruin <sup>3</sup> , Fusarium <sup>4</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte <sup>7</sup>	1,5 L/ha	
Zomerrogge	Bladvlekkenziekte <sup>8</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup> , Echte meeldauw <sup>1</sup> , Fusarium <sup>9</sup>	2,0 L/ha	1
Harde tarwe (overige granen)	Echte meeldauw <sup>1</sup> , Gele bladvlekkenziekte <sup>2</sup> , Kafjesbruin <sup>3</sup> , Fusarium <sup>4</sup> , Bruine roest <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte <sup>7</sup>	1,5 L/ha	

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe graminis*/*Blumeria graminis*)

<sup>2</sup> Gele bladvlekkenziekte (*Drechslera tritici-repentis*/*Pyrenophora tritici-repentis*)

<sup>3</sup> Kafjesbruin (*Parastagonospora nodorum*)

<sup>4</sup> Fusarium (*Fusarium graminearum*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium avenaceum*)

<sup>5</sup> Bruine roest (*Puccinia triticina*, *Puccinia recondita*)

<sup>6</sup> Gele roest (*Puccinia striiformis*)

<sup>7</sup> Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Septoria spp.*)

<sup>8</sup> Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

<sup>9</sup> Fusarium (*Fusarium spp.*)

## Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 150-300 liter water per ha.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en andere bestuivende insecten.

## Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreg) en prothioconazool. Fenpicoxamide hoort tot de picolinamides. De Frac code is C4. Prothioconazool behoort tot de Demethylation Inhibitors (DMI-fungiciden). De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

## LEGE VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

## WERKINGSPECTRUM

Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici/ Septoria spp., Rhynchosporium secalis*)  
Bruine roest (*Puccinia triticina/ Puccinia recondita*)  
Echte meeldauw (*Erysiphe graminis/ Blumeria graminis*)  
Fusarium (*Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, Fusarium spp.*)  
Gele roest (*Puccinia striiformis*)  
Gele bladvlekkenziekte (*Drechslera tritici-repentis/ Pyrenophora tritici-repentis*)  
Kafjesbruin (*Parastagonospora nodorum*)

## GBRUIKSAANWIJZING

Queen® moet preventief worden ingezet. Raadpleeg uw adviseur of de erkenningshouder voor tankmixen met herbiciden of groeiregulatoren.

Schudden voor gebruik.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte te stellen van de mogelijke mengbaarheid met de producten op basis van de op het etiket vermelde werkzame stoffen.

## 1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting. Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten



Einde behandeling

<= 30 minuten =>



regen

## 2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

### 3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van Queen®, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral nauwkeurig worden berekend.

Raadpleeg de «Toolbox Emissiebeperking» op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### 4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

### 5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

#### **NA INSLIKKEN:**

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

#### **NA INADEMING:**

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

#### **BIJ CONTACT MET DE HUID:**

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### **BIJ CONTACT MET DE OGEN:**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen)

## AANSPRAKELIJKHEID

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Corteva™ Agriscience kan echter bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Copy